Observation

Sur une tumeur enchiistée à la partie interne de la cuisse.

Un homme, agé de trente années, portoit une tumeur enkiistée sur les muscles triceps de la partie interne de la cuisse: cette tumeur étoit la suite d'un effort violent qu'il avoit fait en chargeant des balots; à l'instant de cet effort, il avoit ressenti à la cuisse un tiraillement des plus aigus; et quelques jours après il y étoit survenu une tumeur de même grosseur qu'une aveline, qui avoit considérablement protubéré, et étoit parvenu depuis

ARC 42 n° 106

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

sept années, à avoir le volume et la
forme d'un gros melon, avec une base
presqu'aussi large que sa circonférence;
c'étoit exactement un vrai Lypôme.
Une application inconsidérée de topiques
de tous genres, dont le malade avoit fait
usage, pour le faire fondre, avoit ulcéré
la tumeur au point qu'elle étoit
carcinomateuse, ce qui rendoit la maladie
bien plus grave; je craignois même
qu'elle fut incurable, puis qu'il pouvoit
arriver que les humeurs dépravées
de l'ulcère fussent résorbées dans la
masse du sang; ainsi tout m'indiquoit
l'opération: pour y parvenir, je fis
appeller M.M. ....
chirurgiens consultans: je leur
communiquai l'idée que j'avois
conçue de cette maladie; les moyens
par les quels je croyois pouvoir y
apporter remède; et la conduite que je
me promettois de tenir pour cet effet:

je leur proposai la Section circulaire de la peau autour de la baze de la tumeur; et une ligature pour la faire tomber en mortification, avant que de l'amputer; précaution indispensable, attendu le voisinage de l'artère crural qu'il falloit respecter. Les Chirurgiens consultés ayant considéré la largeur de la base, jugerent plus nécessaire, après la Section circulaire de la tumeur, de la traverser avec une aiguile garnie de deux files d'argent, pour pouvoir y pratiquer une ligature à droite et à gauche par le moyen de l'instrument de M. Levret, destiné pour les polypes: Cela fut éxécuté ainsi, mais les files ayant manqué le lendemain, on fut obligé de se contenter d'une seule ligature, (a) puisque pour en pratiquer deux, il eût fallu repasser l'aiguile, afin d'introduire de nouveaux files, et c'est ce qui ne pouvoit plus se faire sans renouveller les douleurs.

(a) s'il eût été possible d'avoir deux ligatures, la mortification de la tumeur eut été plus prompte; je proposai aux deux Chirurgiens consultés, un trocard pour en pareille

Académie nationale de médecine Bibliothèque

Quoiqu'il en soit, la roche se trouva faite après deux jours de ligatures; je me servis alors d'une ficelle cirée, pour serrer plus exactement la tumeur, sans la couper, et huit jours après, j'en fis la section totale, sans le moindre accident: elle étoit si fort gangrenée que je me felicitai de n'avoir pas différé plus longtems: il survint à la suite de cette operation une nouvelle végétation de la grosseur à peu près du poing; je la fis tomber par la suppuration. Enfin pour détruire les dernieres racines du Kiste, j'employai la pierre à cotère disséminée dans l'onguent basilicum; et je suis parvenu à cicatriser la playe

occurence passer des files sans aiguile, et avoir la facilité de passer deux ligatures et même quatre, s'il en étoit nécessaire, sans être obligé de renouveller les douleurs par l'introduction de nouveaux files. La Différence qui se rencontre entre ce trocard et ceux qui sont en usage pour la ponction, ne consiste que dans la canule qui est ouverte dans toute sa longueur pour introduire plus aisement les nouveaux files, et pour que sa présence n'empêche pas l'effet de la compression, ce qui arriveroit avec toute autre canule &c.

Reflexion

sur le Kiste.

Je suis persuadé que toutes les tumeurs enchistées ont en général leur siége dans le tissu cellulaire; j'en ai disséqué quelques unes qui m'en ont convaincu: Mr. Poissonnier Médecin de la Faculté, dont les connoissances sont fort étendues, m'a dit avoir fait la même épreuve que moi, et avoir sur ce genre de Maladie la même opinion.

Le Kiste n'est qu'une, ou plusieurs célules du tissu célulaire ou adipeux dilaté, qui s'épaissit: les Vaisseaux qu'il soutient sont affoiblis distendus; le suc nourrissier s'y arrête, s'y épaissit, s'y assimile, et augmente par ce moyen son Volume; c'est, je crois, par ce Méchanisme, que les tuniques des artères et des Veines, qui ne sont que du tissu célulaire, se dévelopent et se gonflent dans les anévrices

Académie nationale de médecine Bibliothèque

et les varices, de même que les tuniques
des testicules s'épaississent et se dilatent
dans l'hidrocèle, le péritoine dans l'hidropisie;
et généralement toutes les membranes lors-
qu'elles sont distendues.

n° 87.

Labor improbus omnia
Vincit.

Sigault Elève en chirurgie
de St Côme, et accessit de l'école
pratique de paris en 1765.